

**INSTRUCCIONES DE ALTA DEL PACIENTE**  
**Aumento de Senos / Reducción de Senos**

La medicina, la sedación de la anestesia que ha recibido hoy, puede seguir trabajando dentro de su cuerpo durante los próximos días. Puede experimentar mareos, somnolencia y ligeros dolores de cabeza. Trate de descansar tranquilamente durante las próximas 12 a 24 horas y tenga cuidado de sus actividades.

1. **ACTIVIDADES:**

- a. Descanse en casa con moderación por el resto del día.
- b. No conduzca, no opere maquinaria, ni tome ninguna decisión importante el día de hoy.
- c. Si ha tenido anestesia, consiga que alguien más cuide a sus hijos.

2. **DIETA:**

- a. Si no siente náuseas, resume su dieta regular.
- b. No tome bebidas alcohólicas hasta que se termine su medicamento. Si siente náuseas, empiece con líquidos, jugos claros, caldo o sopa, galletas saladas, té y si los líquidos son retenidos, gradualmente agregue alimentos sólidos.
- c. Beba suficientes líquidos.

3. **RECETAS:**

- a. Dolor \_\_\_\_\_ Tome el medicamento de dolor con comida.
- b. Antibióticos \_\_\_\_\_ Termine todo el antibiótico.
- c. Náusea/Vómito \_\_\_\_\_
- d. Inflamación \_\_\_\_\_

4. **CUIDADO DE HERIDA:**

- a. \_\_\_\_\_ Mantenga la gasa intacta y seca hasta su próxima cita.
- b. \_\_\_\_\_ Cambie la gasa si es necesario a partir de \_\_\_\_\_.
- c. \_\_\_\_\_ No se bañe hasta que se le indique.

5. **LLAMAR** al (215) 969-5650 si tiene preguntas o problemas como por ejemplo:

- a. Dolor excesivo que no se alivia ni con el medicamento.
- b. Sangrado o drenaje excesivo, inflamación o enrojecimiento alrededor de la incisión. (SI APLICA)
- c. Escalofríos o fiebre más alta de 100 grados.
- d. Náusea y/o vómito excesivo.

6. **INSTRUCCIONES ESPECIALES:**

- Usted puede utilizar la bomba para el dolor cada 60 minutos conforme la necesite.
- No haga ninguna actividad agotadora, No levante nada pesado, No haga Aerobics.
- No tome Aspirina, Motrin, Advil, Aleve, ni Ibuprofen.
- Aplique hielo en el área durante 20 minutos y luego retírelo por otros 20 minutos.
- No se quite las vendas elásticas.
- Duerma con almohadas extras.
- Evite rascarse la incisión.
- Use el Espirómetro de incentivo cada hora por 10 minutos por las primeras 24 horas, y luego cada 2-3 horas según las instrucciones.

7. **ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUIMIENTO:**

- a. Haga su cita posoperativa antes de irse hoy.

ESTAS INSTRUCCIONES DE ALTA SE HAN EXPLICADO AL PACIENTE/REPRESENTANTE. LA FORMA ORIGINAL SE LE A ENTREGADO AL PACIENTE/REPRESENTANTE Y LA COPIA SE HA ARCHIVADO EN MI EXPEDIENTE MÉDICO.

\_\_\_\_\_  
Firma del Médico

\_\_\_\_\_  
Paciente/Representante